KULLANMA TALİMATI

İhtiyol TCT %10 Merhem Haricen cilde uygulanır.

Etkin madde: Her 20 g merhemde 2 g ihtiyol
Yardımcı Madde (ler): Lanolin susuz (koyun), vazelin

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de İHTİYOL TCT'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında* ***yüksek veya düşük*** *doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. İhtiyol TCT %10 Merhem nedir ve ne için kullanılır?
2. İhtiyol TCT %10 Merhem kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. İhtiyol TCT %10 Merhem nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. İhtiyol TCT %10 Merhem'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ORO ® İHTİYOL nedir ve ne için kullanılır?

İHTİYOL TCT 'de yardımcı madde olan lanolin susuz , hayvansal kaynaklıdır (koyun).
İHTİYOL TCT %10 MERHEM 20 g'lık aluminyum tüplerde sunulan, kahverengi renkte bir merhemdir.
İHTİYOL TCT, antiseptik ve dezenfektanlar adı verilen bir gruba dahil olan ihtiyol adlı etkin maddeyi içerir.
İHTİYOL TCT, iltihabi cilt hastalıklarının (egzama, apse, sivilce ve çıban gibi) olgunlaşıp, içlerinin temizlenerek tedavi edilmesinde kullanılır.

2. İHTİYOL TCT'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İHTİYOL TCT'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
- **İHTİYOL TCT'nin** içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız var ise, kullanmayınız.

İHTİYOL TCT'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- İHTİYOL TCT'yi göz ve mukozalara (bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) temas ettirmeyiniz.
- İHTİYOL TCT kullanımı esnasında enfekte bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır.
- İHTİYOL TCT yüksek oranda kükürt içermektedir; kullanımı sırasında idrarda kükürt oranının arttığına dair bazı kayıtlar bulunmaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İHTİYOL TCT'yi yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İHTİYOL TCT hamilelik döneminde dikkatli kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İHTİYOL TCT kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

İHTİYOL TCT araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

İHTİYOL TCT'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İHTİYOL TCT lanolin susuz (koyun) içermektedir. Lanolin lokal deri reaksiyonlarına (örneğin,kontak dermatite) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İHTİYOL TCT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tedavide en iyi sonuca ulaşmak için İHTİYOL TCT'yi sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa derinizin hastalıklı bölgesine nazikçe sürünüz. İltihap akmaya başladıktan sonra birkaç gün daha günde bir defa İHTİYOL TCT Merhem sürülmeye devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu

İHTİYOL TCT rahatsızlığın bulunduğu bölge yıkanıp kurutulduktan sonra günde iki defa yara üzerine sürülüp gazlı bezle kapatılır. Hava almasına engel olmamak için sıkı bandaj kullanılmamalıdır. İltihap akmaya başladıktan sonra birkaç gün daha günde bir defa ~~ORO~~® İHTİYOL TCT sürülmeye devam edilir. İltihaplı bölge sıkılarak ya da bastırılarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır. Merhem giysilere bulaşabilir ve giysiyi boyayabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım
18 yaş altı çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım
Özel doz ayarlamasına gerek yoktur. Doz ve uygulama şekli yetişkinler ile aynıdır.

Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği

İHTİYOL TCT böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair bir bilgi yoktur.

Eğer İHTİYOL TCT'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İHTİYOL TCT kullandıysanız:

İHTİYOL TCT yüksek oranda kükürt içermektedir, gerekenden fazla miktarda kullanıldığında idrarda kükürt oranının arttığına dair bazı kayıtlar bulunmaktadır.

İHTİYOL TCT'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İHTİYOL TCT **kullanmayı unutursanız:**
Doz uygulanması atlanmamalıdır. Eğer kullanma dozu unutulursa, elden geldiği kadar çabuk giderilmeli ve doz programına devam edilmelidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İHTİYOL TCT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İHTİYOL TCT ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi İHTİYOL TCT'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın yan etkiler:
- Deride renk değişikliği

Yaygın olmayan yan etkiler:
- Deride tahriş ve şiddetli kaşıntı,
- Aşırı duyarlık reaksiyonları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. İHTİYOL TCT'nin saklanması

İHTİYOL TCT'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İHTİYOL TCT'yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bir bozukluk fark ederseniz *İHTİYOL TCT'yi kullanmayınız.*

"Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz."

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgilere, akıllı telefon/tablet veya bir karekod okuyucu ile karekodu tarayarak ulaşabilirsiniz.

Ruhsat Sahibi: TCT Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kadıköy / İSTANBUL

Üretim yeri: Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş
Çekmeköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 01.08.2024 tarihinde onaylanmıştır.